

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

第3類医薬品 のどの殺菌・消毒，口臭除去

イソジン®うがい薬C

清涼化剤 L-メントール(添加物)と、すっきり感をアップさせる香料(添加物)配合。お口とのどに、すっきり清涼感強めのイソジンうがい薬です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)
次の人は使用しないでください。

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) 口内のひどいただれのある人
- (3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量

うすめずにそのまま適量（約15～20mL）を口に含んで、2～3回うがいをする。これを1日数回行ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用ください。
- 本剤はうがい用のみに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。
- 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

成分・分量

1mL中 ポピドンヨード3.5mg（有効ヨウ素として0.35mg）
添加物として エタノール、グリセリン、l-メントール、サッカリンナトリウム、pH調整剤、香料、その他1成分を含有しています。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯など）が変色することがあります。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変化します。）
- (4) 衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、

または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」

電話：[大阪] 06-6209-6948

[東京] 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

®：イソジン®はムンディファーマの登録商標です。