



この説明書は、本剤とともに
保管し、服用の際には、よくお読みください。

シュガーレス〈いちご味〉


鎮咳去痰薬 **浅田飴子供せきどめドロップS**

第②類医薬品

【ご使用上の注意】 

してはいけないこと 

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること 

■ 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 高熱のある人 (7) 心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害の診断を受けた人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は
服用を中止し、この説明書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者にご相談
ください。

【効能・効果】

せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)
をともなうせき、たん、のどの炎症による声がれ・
のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

次の量を口の中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。
服用間隔は2時間以上おいてください。

年齢	8~14才	5~7才	5才未満
1回量	2錠	1錠	服用しないこと
服用回数	1日6回		

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】12錠中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩…… 25mg クレゾールスルホン酸カリウム…… 90mg
セチルピリジニウム塩化物水和物… 3mg

添加物として還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK、ビタミンC、アラビアゴム、カルナウバロウ、タルク、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、CMC-Na、香料、プロピレングリコール含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)5才未満の乳幼児の場合には、のどにつかえるおそれがありますので服用をさけてください。(2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタをしっかりとめて保管してください。(3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

製造販売元 **株式会社 浅田飴**

東京都東村山市久米川町5-29-7

お問合せ先 お客様相談室

電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)

時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

0915M1